



Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung



Vernis fluoré pour la désensibilisation des dents



Laca dental desensibilizante con fluoruros



Verniz dessensibilizante dentário com flúor



Vernice desensibilizzante contenente fluoro

VOCO**VOCO Profluorid Varnish**

0482

Fluoride-containing dental desensitising varnish

Instructions for use

Product description:

VOCO Profluorid Varnish is a fluoride-containing dental desensitising varnish for surface application to enamel and dentine.**VOCO Profluorid Varnish** adheres to moist surfaces and is tolerant to moisture and saliva.**VOCO Profluorid Varnish** is an ethanolic suspension of colophony with artificial flavouring and xylitol sweetening.1 ml of **VOCO Profluorid Varnish** contains 50 mg of sodium fluoride equivalent to 22,6 mg of fluoride.

Indications:

VOCO Profluorid Varnish is intended for use for:

- treatment of hypersensitive teeth
- sealing the dentinal tubules, e.g. for cavity preparation or on sensitive root surfaces

Methods of use:

Recommended dosage

- Treatment of patients with primary dentition approx. 0,25 ml of **VOCO Profluorid Varnish**
- Treatment of patients with adolescent or permanent dentition approx. 0,40 ml of **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish is applied as a thin film on the dental hard substance. Thick films peel off easily and do not provide therapeutic advantages.

By experience, the required amount for a complete set of teeth ranges between 0,25 ml and 0,40 ml.

Application:

- Thoroughly clean tartar from treatment areas.
- To improve results, eliminate any excessive moisture/saliva from area to be treated.
- Uniformly apply **VOCO Profluorid Varnish** as a thin film, covering the entire target surface.
- Moisten area of application (either by gentle rinsing or natural salivary flow) to ensure proper setting of **VOCO Profluorid Varnish**.
- Instruct patient to avoid solids, alcohol, brushing and flossing for 4 hours after application.

Information/precautionary measures:

VOCO Profluorid Varnish contains colophony.**VOCO Profluorid Varnish** should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to this ingredient. Colophony may inhibit polymerisation and adhesion of composites.The cartridge must always be used with the blunt application cannula intended for that purpose (length 32 mm, diameter 0.9 mm). **VOCO Profluorid Varnish** cartridges are reusable. Remove cannula after application and store cartridge without cannula (cartridge is sealed tightly by the rubber septum). Attach a new cannula for the next application.According to its purpose, **VOCO Profluorid Varnish** has a sticky consistency. Material remaining on the screw thread of the tube may cause the cap to stick. Wipe off any contaminating residues with an ethanol-containing cloth.**VOCO Profluorid Varnish** is contraindicated in patients with ulcerative gingivitis or stomatitis.**VOCO Profluorid Varnish** is not intended for systemic treatment. Oedematous swellings have been reported on rare occasions especially following application to extensive surfaces.

Dyspnoea in asthmatic children has been reported for comparable preparations in extremely rare cases.

Patients with sensitive digestive systems may experience nausea, usually after extensive treatment.

In case of hypersensitivity, remove varnish with a soft toothbrush and floss, then rinse with warm water.

No application of other fluoride preparations should be carried out on day of treatment.

Suspend treatment with fluoride tablets for several days after treatment with **VOCO Profluorid Varnish**.

Do not swallow the varnish.

Storage:

Store at temperatures between 4 °C - 23 °C. Do not use **VOCO Profluorid Varnish** after expiry date.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.

Gebrauchsanweisung

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Instruções de utilização

Istruzioni per l'uso

Produktbeschreibung:

VOCO Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. **VOCO Profluorid Varnish** haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. **VOCO Profluorid Varnish** ist eine ethanoliche Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol.1 ml **VOCO Profluorid Varnish** beinhaltet 50 mg Natriumfluorid entsprechend 22,6 mg Fluorid.

Indikationen:

VOCO Profluorid Varnish ist bestimmt für:

- die Behandlung von hypersensiblen Zähnen
- die Versiegelung der Dentintubuli bei Kavitätenträgerpräparationen oder empfindlichen Wurzeloberflächen

Art der Anwendung:

Empfohlene Dosis

- Behandlung von Patienten mit Milchgebiss ca. 0,25 ml **VOCO Profluorid Varnish**
- Behandlung von Patienten mit Wechselgebiss oder bleibendem Gebiss ca. 0,40 ml **VOCO Profluorid Varnish**

Einen dünnen Film **VOCO Profluorid Varnish** auf die Zahnhartsubstanz auftragen. Ein dicker Film löst sich leicht ab und bietet keine therapeutischen Vorteile. Erfahrungsgemäß liegt der benötigte Bedarf für ein komplettes Gebiss zwischen 0,25 ml und 0,40 ml.

Anwendung:

- Behandlungsfläche gründlich von Zahnstein reinigen.
- Für ein besseres Ergebnis, überschüssige Feuchtigkeit/Speichel komplett von der zu behandelnden Fläche entfernen.
- VOCO Profluorid Varnish** gleichmäßig auftragen, so dass die komplette Oberfläche mit einem dünnen Film bedeckt ist.
- Anwendungsbereich befeuchten (entweder durch leichte Spülung oder durch natürlichen Speichelfluid), um eine Abbindung von **VOCO Profluorid Varnish** zu gewährleisten.
- Patienten müssen darauf hingewiesen werden, 4 Stunden nach der Behandlung feste Nahrung, Alkohol, das Reinigen der Zähne sowie das Benutzen von Zahnpasta zu vermeiden.

Hinweise/Vorsichtsmaßnahmen:

VOCO Profluorid Varnish enthält Kolophonium.Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von **VOCO Profluorid Varnish** ist auf die Anwendung zu verzichten.

Kolophonium kann die Polymerisation und die Haftung von Compositen beeinträchtigen.

Bei Verwendung der Zylinderampulle stets nur die dafür vorgesehenen stumpfen Applikationskanülen (Länge 32 mm, Durchmesser 0,9 mm) benutzen. **VOCO Profluorid Varnish** in der Zylinderampulle ist mehrmals verwendbar. Nach Applikation Kanüle entfernen und Zylinderampulle ohne Kanüle lagern (Ampulle ist durch das Septum-Gummi dicht verschlossen). Vor der nächsten Applikation neue Kanüle aufsetzen.Seinen Anwendungszweck entsprechend hat **VOCO Profluorid Varnish** eine körbige Konsistenz. Bei Verwendung der Tube können Materialreste auf dem Schraubgewinde zur Verklebung des Deckels führen. Ggf. Verunreinigungen mit einem ethanolhaltigen Tuch abwischen.**VOCO Profluorid Varnish** ist nicht anzuwenden bei Patienten mit ulzerierenden Zahnfleisch- oder Mundschleimhautzündungen. **VOCO Profluorid Varnish** ist nicht für systemische Behandlung bestimmt.

Selten wurde über ödematische Schwellungen, besonders nach Anwendung auf größeren Oberflächen, berichtet.

Bei vergleichbaren Präparaten wurde sehr selten über Atemnot bei Kindern mit Asthma berichtet.

Bei Patienten mit empfindlichem Verdauungssystem kann nach umfangreicher Behandlung Überbelüftung auftreten.

Bei Überempfindlichkeit: Lack mit weicher Zahnbürste und Zahnpasta entfernen, anschließend mit warmem Wasser spülen.

Am Tag der Behandlung keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen Präparaten vornehmen.

Die Einnahme von Fluoridtabletten nach Behandlung mit **VOCO Profluorid Varnish** einige Tage aussetzen.

Lack nicht verschlucken.

Ne pas avaler le vernis.

Lagerung:

Lagerung bei 4 °C - 23 °C. **VOCO Profluorid Varnish** nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

Vernis fluoré pour la désensibilisation des dents

Mode d'emploi

Laca dental desensibilizante con fluoruros

Instrucciones de uso

Verniz dessensibilizante dentário com flúor

Instruções de utilização

Descrizione del prodotto:

VOCO Profluorid Varnish est un vernis fluoré pour le traitement superficiel de l'émail et de la dentine.**VOCO Profluorid Varnish** adhère à des surfaces humides et tolère l'humidité et la salive restantes.**VOCO Profluorid Varnish** est une suspension éthanolique composée de colophonium avec un arôme artificiel et de l'éducatant xylitol.1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contient 50 mg de fluoro de sodio équivalente à 22,6 mg de fluorure.1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contiene 50 mg de fluoro de sodio equivalente a 22,6 mg de fluoruro.

Description du produit :

VOCO Profluorid Varnish est un vernis fluoré pour le traitement superficiel de l'émail et de la dentine.**VOCO Profluorid Varnish** adhère à des surfaces humides et tolère l'humidité et la salive restantes.**VOCO Profluorid Varnish** est une suspension éthanolique composée de colophonium avec un arôme artificiel et de l'éducatant xylitol.1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contient 50 mg de fluorure de sodium ce qui correspond à 22,6 mg de fluorures.

Indications :

VOCO Profluorid Varnish est indiqué pour :

- le traitement de dents hypersensibles
- le scellement des tubulis dentinaires dans les cavités préparées ou sur les surfaces radiculaires sensibles

Domaines d'application :

Dosage recommandé

- Pour le traitement de patients avec la dentition primaire env. 0,25 ml de **VOCO Profluorid Varnish**
- Pour le traitement de patients avec une dentition mixte ou la dentition permanente : env. 0,40 ml de **VOCO Profluorid Varnish**

Appliquer une couche fine de **VOCO Profluorid Varnish** sur les tissus dentaires. Une couche épaisse se décolle facilement et n'offre pas des avantages thérapeutiques.

L'expérience montre que la quantité nécessaire pour une denture complète est de 0,25 ml à 0,40 ml.

Application :

- Nettoyer les surfaces à traiter soigneusement et éliminer le tartre.
- Pour meilleurs résultats, éliminez complètement la humidité/saliva excésive de la surface à traiter.
- Appliquer **VOCO Profluorid Varnish** uniformément, numa camada fina cobrindo toda a superfície a ser tratada.
- Aplicar **VOCO Profluorid Varnish** regularmente sobre toda a superficie.
- Humectar las superficies a tratar (o bien con enjuague suave o flujo de saliva natural) para asegurar un fragado de **VOCO Profluorid Varnish**.
- Informar los pacientes qu'il faut renoncer à des aliments solides, de l'alcool, le nettoyage des dents et l'utilisation de la soie dentaire dans les 4 heures qui suivent la application.

Indications/précautions :

VOCO Profluorid Varnish contient colophonium.Dans le cas d'hypersensibilités (allergies) connues à ce composant de **VOCO Profluorid Varnish** ne pas utiliser le produit.

Colophonium peut influencer la polymérisation et l'adhésion des composites.

La caroube doit toujours être utilisée avec les canules d'application épointées prévues à cet effet (longueur 32 mm, diamètre 0,9 mm). **VOCO Profluorid Varnish** en caroube est réutilisable. Enlever la canule après l'application et stocker la caroube sans canule (la caroube est fermée de manière étanche par le septum en caoutchouc). Placer une nouvelle canule avant la prochaine application.**VOCO Profluorid Varnish** a une consistance collante, ce qui répond à son indication. Les restes de matière sur la vis filetée du tube peuvent occasionner l'agglomération du bouchon.Ne pas utiliser **VOCO Profluorid Varnish** pour les patients présentant une inflammation ulcérale de la gencive ou de la muqueuse buccale. **VOCO Profluorid Varnish** n'est pas indiqué pour le traitement systémique.

Dans peu de cas des enflures cédématoises, particulièrement lors du traitement des plus grandes surfaces, ont été observées.

Lors de l'utilisation de produits comparables, dans très peu de cas une dyspnée chez les enfants asthmatiques a été observée. En préparations comparables se reporta poca veces sobre disnea en conexión con niños asmáticos.

Pacientes que tienen sistemas digestivos sensibles pueden experimentar náuseas, normalmente después de un tratamiento extenso. En caso de reacción adversa remova o verniz com uma escova macia e fio dental e lave com agua morna.

En caso de hipersensibilidad: Elimíñese la laca con un cepillo de dientes blando y seda dental, luego lavar con agua caliente. No realizar el tratamiento con otros preparados de fluoruros en el día de la aplicación.

Suspender la toma de comprimidos de fluoruro por unos días después del tratamiento con **VOCO Profluorid Varnish**. No tragar la laca.

Stockage :

Stocker à une température entre 4 °C et 23 °C. Ne plus utiliser **VOCO Profluorid Varnish** après la date de péremption.

Conservación:



Οδοντικό βερνίκι απευαισθητοποίησης με φθόριο

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος:
Το VOCO Profluorid Varnish είναι ένα οδοντικό βερνίκι απευαισθητοποίησης με φθόριο για τοποθέτηση σε επιφάνειες αδαμαντίνης και δοντίνης.

Το VOCO Profluorid Varnish προσκολλάται σε υψρές επιφάνειες και είναι ανθεκτικό σε υγρασία και σάλιο.

Το VOCO Profluorid Varnish είναι αιώριμη κολοφωνίου σε αιθανόλη με τεχνητές γεύσεις και γλυκαντική ουσία έξιτόλης. 1 ml VOCO Profluorid Varnish περιέχει 50 mg φθοριούχου νατρίου ισοδύναμο με 22,6 mg φθόριο.

Ενδείξεις:
Το VOCO Profluorid Varnish ενδείκνυται για χρήση σε:
1. θεραπεία υπερευαισθητών δοντών
2. σιλαντοποίηση οδοντικών αυλάκων, π.χ. για την πρεσοιμασία κοιλοτήτων ή σε ευαίσθητες ριζικές επιφάνειες

Μέθοδος εφαρμογής:

- Θεραπεία ασθενών με πρωτογενή οδοντοστοιχία χρήση περίπου 0,25 ml του VOCO Profluorid Varnish
- Θεραπεία ασθενών με εθιβική ή μόνιμη οδοντοστοιχία περίπου 0,40 ml του VOCO Profluorid Varnish

Το VOCO Profluorid Varnish τοποθετείται σαν λεπτό στρώμα στη σκληρή οδοντική ουσία. Τα παχιά στρώματα φθείρονται πιο εύκολα και δεν πάρεται καλύτερη θεραπεία ίδιοτες. Βάση εμπειρίας η απαιτούμενη ποσότητα εκτείνεται μεταξύ 0,25 ml και 0,40 ml για μια ολοκληρωμένη οδοντοστοιχία.

Εφαρμογή:

1. Καθαρίστε επιμελώς την οδοντική πλάκα από την περιοχή που θα θεραπεύεται.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα, περιορίστε όποια περισσειαία υγρασίας/σάλιο από την περιοχή που θα θεραπεύεται.
3. Απλώστε ομοιόμορφα το VOCO Profluorid Varnish σαν λεπτό στρώμα, καλύπτοντας ολόκληρη την επιθυμητή επιφάνεια.
4. Επιτρέψτε στην περιοχή να γίνει υγρή (έτει με ελαφρύ ψεκασμό είτε με τη φυσική ροή του σάλιου) για να διασφαλίσετε την ουστήτη πήγη του VOCO Profluorid Varnish.
5. Συμβούλεψτε τον ασθενή να αποφύγει σκληρή τροφή, αλκοόλ, βούτησμα και οδοντόνημα για τις επόμενες 4 ώρες μετά την εφαρμογή.

Συμβουλές/προληπτικά μέτρα:

Το VOCO Profluorid Varnish περιέχει κολοφώνιο.

Το VOCO Profluorid Varnish δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευαισθησιών (αλλεργίες) σε αυτό το συστατικό.

Το κολοφώνιο μπορεί να παρεμποδίσει τον πολυμερισμό και την συγκρότηση των σύνθετων ρητρινών.

Η φύσιγγα θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με το αμβλύ ρύγχος εφαρμογής που προορίζεται για αυτό το σκοπό (μήκος 32 mm, διάμετρος 0,9 mm). Οι φύσιγγες VOCO Profluorid Varnish είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Αφαιρέστε το σύρχος μετά την χρήση και αποθηκεύστε τη φύσιγγα χωρίς ρύγχος (η φύσιγγα σφραγίζεται αεροστρέγμα με το ελαστικό διάφραγμα). Εφαρμόστε ένα καινούριο ρύγχος με την νέα χρήση.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το VOCO Profluorid Varnish έχει μια κολώνωση σύστασης. Το υλικό που παραμένει στο σπηρόλα στο στρώμα του αωγλαρίου μπορεί να κολλήσει με το καπάκι. Σκοπιάστε κάθε περίσσεια μολυσμένου υλικού με ένα πανάκι με αισθαντόλ.

Το VOCO Profluorid Varnish αντείκνυται για ασθενείς με ελκώντη ουλήτιδα ή στοματική χρήση. Διότι μάτια έχουν αναφερθεί σε σπάνιες περιπτώσεις, ειδικά μετά από επειταμένη θεραπεία.

Δύοτρια σε ασθματικά παιδιά έχει αναφερθεί σε παρόμοια παρασκευάσματα σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Ασθενείς με ευαισθησία στη πεπτική τους σύστημα μπορεί να έχουν ναυτιά, συνίθιμος μετά από επειταμένη θεραπεία.

Σε περιπτώσεις θυμερέων αντιδράσεων, αφαιρέστε το βερνίκι με μια μαλακή οδοντόβουρτσα και νήμα, και στη συνέχεια έπλυντε με ζεστό νερό.

Μη θεραπεύετε με άλλα παρασκευάσματα φθορίου την ίδια ημέρα την εφαρμογή.

Αναβάλετε την θεραπεία με φθοριούχες ταμπλέτες για μερικές ημέρες μετά τη θεραπεία με VOCO Profluorid Varnish.

Μην καταπίνετε το βερνίκι.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 °C - 23 °C. Μην χρησιμοποιείτε το VOCO Profluorid Varnish μετά την ημερομηνία λήξης.

Τα παρασκευάσματά μας δημιουργήθηκαν για οδοντιατρική χρήση. Όσον αφορά στην εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισμένες στην πολυτελή γνώση μας και δεν είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές μας δεν αποτελούν τη δική σας εξέταση και δοκιμή των προϊόντων μας προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όμως για οποιαδήποτε δοκιμή που γίνεται χωρίς τον δικό μας ελεγχό, η ευθύνη είναι αποκλειστικά του χρήστη. Συσκά, εγγύομαστε για την ποιότητα των παρασκευάσματων μας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και ανάλογα με τους καθορισμένους γενικούς όρους πώλησης και διάθεσης.



Fluoride houdende lak voor tanddesensibilisering

Gebruiksaanwijzing

Περιγραφή προϊόντος:
Το VOCO Profluorid Varnish είναι ένα οδοντικό βερνίκι απευαισθητοποίησης με φθόριο για τοποθέτηση σε επιφάνειες αδαμαντίνης και δοντίνης.

Το VOCO Profluorid Varnish προσκολλάται σε υψρές επιφάνειες και είναι ανθεκτικό σε υγρασία και σάλιο.

Το VOCO Profluorid Varnish είναι αιώριμη κολοφωνίου σε αιθανόλη με τεχνητές γεύσεις και γλυκαντική ουσία έξιτόλης. 1 ml VOCO Profluorid Varnish περιέχει 50 mg φθοριούχου νατρίου ισοδύναμο με 22,6 mg φθόριο.

Ενδείξεις:
Το VOCO Profluorid Varnish ενδείκνυται για χρήση σε:
1. θεραπεία υπερευαισθητών δοντών
2. σιλαντοποίηση οδοντικών αυλάκων, π.χ. για την πρεσοιμασία κοιλοτήτων ή σε ευαίσθητες ριζικές επιφάνειες

Μέθοδος εφαρμογής:
• Θεραπεία ασθενών με πρωτογενή οδοντοστοιχία χρήση περίπου 0,25 ml του VOCO Profluorid Varnish
• Θεραπεία ασθενών με εθιβική ή μόνιμη οδοντοστοιχία περίπου 0,40 ml του VOCO Profluorid Varnish

Το VOCO Profluorid Varnish τοποθετείται σαν λεπτό στρώμα στη σκληρή οδοντική ουσία. Τα παχιά στρώματα φθείρονται πιο εύκολα και δεν πάρεται καλύτερη θεραπεία ίδιοτες. Βάση εμπειρίας η απαιτούμενη ποσότητα εκτείνεται μεταξύ 0,25 ml και 0,40 ml για μια ολοκληρωμένη οδοντοστοιχία.

Εφαρμογή:
1. Καθαρίστε επιμελώς την οδοντική πλάκα από την περιοχή που θα θεραπεύεται.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα, περιορίστε όποια περισσειαία υγρασίας/σάλιο από την περιοχή που θα θεραπεύεται.
3. Απλώστε ομοιόμορφα το VOCO Profluorid Varnish σαν λεπτό στρώμα, καλύπτοντας ολόκληρη την επιθυμητή επιφάνεια.
4. Επιτρέψτε στην περιοχή να γίνει υγρή (έτει με ελαφρύ ψεκασμό είτε με τη φυσική ροή του σάλιου) για να διασφαλίσετε την ουστήτη πήγη του VOCO Profluorid Varnish.
5. Συμβούλεψτε τον ασθενή να αποφύγει σκληρή τροφή, αλκοόλ, βούτησμα και οδοντόνημα για τις επόμενες 4 ώρες μετά την εφαρμογή.

Συμβουλές/προληπτικά μέτρα:

Το VOCO Profluorid Varnish περιέχει κολοφώνιο.

Το VOCO Profluorid Varnish δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευαισθησιών (αλλεργίες) σε αυτό το συστατικό.

Το κολοφώνιο μπορεί να παρεμποδίσει τον πολυμερισμό και την συγκρότηση των σύνθετων ρητρινών.

Η φύσιγγα θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με το αμβλύ ρύγχος που προορίζεται για αυτό το σκοπό (μήκος 32 mm, διάμετρος 0,9 mm).

Οι φύσιγγες VOCO Profluorid Varnish είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Αφαιρέστε το σύρχος μετά την χρήση και αποθηκεύστε τη φύσιγγα χωρίς ρύγχος (η φύσιγγα σφραγίζεται αεροστρέγμα με το ελαστικό διάφραγμα). Εφαρμόστε ένα καινούριο ρύγχος με την νέα χρήση.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το VOCO Profluorid Varnish έχει μια κολώνωση σύστασης. Το υλικό που παραμένει στο σπηρόλα στο στρώμα του αωγλαρίου μπορεί να κολλήσει με το καπάκι. Σκοπιάστε κάθε περίσσεια μολυσμένου υλικού με ένα πανάκι με αισθαντόλ.


Το VOCO Profluorid Varnish αντείκνυται για ασθενείς με ελκώντη ουλήτιδα ή στοματική χρήση. Διότι μάτια έχουν αναφερθεί σε σπάνιες περιπτώσεις, ειδικά μετά από επειταμένη θεραπεία.

Δύοτρια σε ασθματικά παιδιά έχει αναφερθεί σε παρόμοια παρασκευάσματα σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Ασθενείς με ευαισθησία στη πεπτική τους σύστημα μπορεί να έχουν ναυτιά, συνίθιμος μετά από επειταμένη θεραπεία.

Σε περιπτώσεις θυμερέων αντιδράσεων, αφαιρέστε το βερνίκι με μια μαλακή οδοντόβουρτσα και νήμα, και στη συνέχεια έπλυντε με ζεστό νερό.

Μη θεραπεύετε με άλλα παρασκευάσματα φθορίου τ



VOCO Profluorid Varnish

(VOCO Profluorid Varnish)

Фторсодержащий лак для десенсибилизации зубов
Разрешен к применению на территории

№ ФСЗ 2009/05712

Информация по применению

Описание материала:

VOCO Профлуорид Варниш представляет собой фторсодержащий лак для десенсибилизации зубов при обработке поверхности эмали и дентина.

VOCO Профлуорид Варниш прилипает к влажным поверхностям и является толерантным к присутствию остатков влаги и слюны.

VOCO Профлуорид Варниш - это этаноловая супензия из каучука с искусственным ароматом и сладким привкусом кипятилки.

1 мл **VOCO Профлуорид Варниш** содержит 50 мг фторида натрия, эквивалентных 22,6 мг фтора.

Показания:

VOCO Профлуорид Варниш предназначен:
1. Для обработки гиперчувствительных зубов
2. Для герметизации дентинных канальцев в препарированных полостях или на чувствительных поверхностях корней

Способ применения:

- Рекомендемуемая дозировка
 - Для лечения пациентов во временному прикусе ≈ 0,25 мл **VOCO Профлуорид Варниш**
 - Для лечения пациентов в смешном или постоянном прикусе ≈ 0,40 мл **VOCO Профлуорид Варниш**

Нанести **VOCO Профлуорид Варниш** тонким слоем на твердые ткани зуба. Толстый слой пленки легко отделяется и не оказывает терапевтического эффекта. Для полного призыва опытным путем установлено необходимое количество препарата, составляющее от 0,25 до 0,40 мл.

Применение:

1. Обрабатываемые участки тщательно очистить от зубного камня.
2. Для достижения лучшего результата удалить с обрабатываемых поверхностей избытки влаги/слюны.
3. Равномерно нанести **VOCO Профлуорид Варниш**, покрываюая целиком влажную поверхность лаком.
4. Уплотнить обрабатываемую поверхность (легким промыванием или благодаря естественному попаданию слюны), чтобы обеспечить застывание **VOCO Профлуорид Варниш**.
5. Пронестируировать пациента, и в окресии 4 godzin od zaniechania nie powinien spozywać pokarmów stałych, alkoholu, szczotkować zębów oraz używać nici dentystycznej.

Указания/меры предосторожности:

VOCO Профлуорид Варниш содержит природную смолу (каифоль).

При наличии повышенной чувствительности (аллергии) к данному компоненту **VOCO Профлуорид Варниш**, следует отказаться от его применения.

Каифоль может оказывать отрицательное влияние на полимеризацию и адгезию композитов.

При использовании цилиндрической ампулы обязательно использовать предназначенные для этой цели приглушенные аппликаторные канюли (длина 32 мм, диаметр 0,9 мм). **VOCO Профлуорид Варниш** в цилиндрической ампуле предназначен для многоразового пользования. После аппликации удалить канюль и хранить цилиндрическую ампулу без канюлей. Ампула остается плотно закрытой благодаря резиновой перегородке. Перед следующим применением насыдить новую канюль.

В соответствии с его глянцевым назначением **VOCO Профлуорид Варниш** обладает липкой консистенцией. Остатки материала на винтовой резьбе тубы могут приводить к прилипанию колпачка. При необходимости, загрязнения следует очистить с помощью салфетки, смоченной в спирте.

Не применять **VOCO Профлуорид Варниш** у пациентов с язвенными воспалениями десны или слизистых поверхностей полости рта. **VOCO Профлуорид Варниш** не предназначен для системного применения.

В рядких случаях сообщалось об отечных проявлениях, особенно после использования на больших участках.

При применении сопоставимых препаратов сообщалось о крайне редких случаях возникновения одышки у детей, страдающих астмой. У пациентов с чувствительной пищеварительной системой после обработки обширных участков возможно появление тошноты.

При наличии повышенной чувствительности к **VOCO Профлуорид Варниш**: удалить лак с помощью мягкой зубной щетки и зубной нити, в заключение промыть теплой водой.

В день проведения процедуры не использовать другие фторсодержащие препараты.

После проведения лечения лаком **VOCO Профлуорид Варниш** на несколько дней приостановить прием таблеток, содержащих фтор. Лак не глотать.

Хранение:

Хранить при температуре 4 °C - 23 °C. После истечения срока годности **VOCO Профлуорид Варниш** не применять.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обзывающими. Наши указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - установленным стандартам.



Lakier fluorowy do desensityzacji zębów

Instrukcja użycia

Opis produktu:

Lakier fluorowy **VOCO Profluorid Varnish** jest przeznaczony do desensietyzacji powierzchni szkliw i zębów.

VOCO Profluorid Varnish wiąże się z wilgotnymi powierzchniami, a obecność resztowej wilgoci czy śliny nie wpływa na jego skuteczność.

VOCO Profluorid Varnish jest etanolową zawiesiną kalafonii z dodatkiem sztucznego aromatu oraz substancji słodzącej - ksylitolu.

1 ml zawiesiny **VOCO Profluorid Varnish** zawiera 50 mg fluoru sodu, co odpowiada 22,6 mg fluoru.

Wskazania:

VOCO Profluorid Varnish jest przeznaczony do:

1. leczenia nadwrażliwości zębów
2. zamknięcia i uszczelniania kanalików zębowych podczas preparacji ubytku oraz w przypadkach nadwrażliwości odsłoniętych powierzchni korzenia zęba

Dawkowanie:

Zalecane dawki

- Pacjenci z uzębieniem mlecznym ok. 0,25 ml lakieru **VOCO Profluorid Varnish**
- Pacjenci z uzębieniem mieszanym lub stałym ok. 0,40 ml lakieru **VOCO Profluorid Varnish**

Na twardy tkanki zęba nanieść cienką warstwę lakieru **VOCO Profluorid Varnish**. Grubsza warstwa zawiesiny ulega szybkiemu złuszczeniu i nie zapewnia lepszego efektu terapeutycznego. Doswiadczenie ustaloną, iż ilość preparatu potrzebna do pokrycia pełnego uzębienia wynosi między 0,25 ml a 0,40 ml.

Aplikacja:

1. Leczoną powierzchnię dokładnie oczyścić z kamienia naźbnego.
2. Najlepsze wyniki zapewnia całkowite usunięcie nadmiaru wilgoci/sliny z leczonych powierzchni.
3. Równomiernie rozprowadzić **VOCO Profluorid Varnish**, pokrywając całą powierzchnię cienką warstwą lakieru.
4. Aby zapewnić prawidłowe przyleganie lakieru **VOCO Profluorid Varnish** zwilżyć leczoną powierzchnię (poprzez delikatne płukanie lub umożliwienie swobodnego przepływu śliny).
5. Należy poinformować pacjenta, iż w okresie 4 godzin od zabiegów nie powinien spożywać pokarmów stałych, alkoholu, szczotkować zębów oraz używać nici dentystycznej.

Informacje/środki ostrożności:

VOCO Profluorid Varnish zawiera kalafonię.

Przy rozpoznaniu nadwrażliwości (alergii) na składniki **VOCO Profluorid Varnish** należy zrezygnować z aplikacji preparatu.

Kalafonia może mieć wpływ na przebieg procesu polimeryzacji i przylegania kompozytu.

W przypadku korzystania z ampułkostrzykawki, proszę pamiętać o tym, aby zawsze używać do niej przeznaczonej igły aplikacyjnej (długość 32 mm, średnica 0,9 mm). **VOCO Profluorid Varnish** z ampułkostrzykawką jest przeznaczona dla wielokrotnego użytku.

Po aplikacji usunąć igłę. Ampułkostrzykawkę należy przechowywać bez igły (ampułka jest uszczeliona). Przed kolejną aplikacją, należy nałożyć nową igłę. Zgodnie z przeznaczeniem materiału, **VOCO Profluorid Varnish** ma lepką konsystencję.

Resztki materiału pozostające na gwincie mogą powodować przyklejenie się nakrętek.

Należy usunąć wszelkie pozostałości za pomocą ściereczki nasączonej etanolem.

Lakier **VOCO Profluorid Varnish** nie należy stosować u pacjentów z wątkami w reżimie rzeby tuby mogą przewodnić krytki. Weśkerý nezádoucí materiál proto otřete kusem látky namočeným v etanolu.

VOCO Profluorid Varnish je kontraindikován u pacientů s ulcerózní gingivitidou nebo stomatití.

Ne применять **VOCO Profluorid Varnish** у пациентов с язвенными воспалениями десны или слизистых поверхностей полости рта. **VOCO Profluorid Varnish** не предназначен для системного применения.

W rzadkich przypadkach obserwowano obrzęki po pokryciu preparatem dużych powierzchni.

W niektórych случаях сообщалось об отечных проявлениях, особенно после использования на больших участках.

При применении сопоставимых препаратов сообщалось о крайне редких случаях возникновения одышki u detej, stradajacych astmoy. U pacientow z czuciuwalna systemem po sluzowej pozywki.

W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości należy usunąć lakier przy pomocy miękkiej szczoteczki do zębów oraz nici dentystycznej, a następnie spłukać ciepłą wodą.

W dniu leczenia nie stosować innych preparatów zawierających związki fluoru.

W dniu leczenia preparatem **VOCO Profluorid Varnish** należy na kilka dni przerwać stosowanie leków zawierających związki fluoru. Po leczeniu preparatem **VOCO Profluorid Varnish** należy na kilka dni przerwać stosowanie leków zawierających związki fluoru. Nie połykać lakieru.

Nie połykać.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 4 °C - 23 °C. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Oferowane przez nas preparaty opracowano do stosowania w stomatologii. Udzierlamy ustnych i pisemnych porad dotyczących stosowania dostarczonych przez nas preparatów wedle naszej najlepszej wiedzy, nie możemy jednak ponosić za nie odpowiedzialności. Udzierlane przez nas informacje i/lub porady nie zasługują Państwu z obowiązkową sprawdzeniem przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych celów. Ponieważ stosowanie naszych produktów przebiega bez naszej kontroli, odpowiedzialność za ich prawidłowe użycie leży całkowicie po Państwa stronie. Oczyszczamy gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów spełniających obecnie obowiązujące normy oraz standardy opisane w ogólnych warunkach dostarczanych i sprzedazy produktów.



Lak s obsahem fluoridu na snížení citlivosti zubů

Návod k použití

Popis produktu:

Lak s obsahem fluoridu na snížení citlivosti zubů je lak s obsahem fluoridu na snížení citlivosti zubů určený k nanášení na povrch skloviny a dentinu.

VOCO Profluorid Varnish drží i na vlhkém povrchu a je tolerantní vůči vlhkosti a slinám.

VOCO Profluorid Varnish je kalafunová emulze na bázi etanolu doplněná o aroma a ochucená xylitolom.

1 ml ml **VOCO Profluorid Varnish** obsahuje 50 mg fluoru sodu, co odpovídá 22,6 mg fluoru.

Indikace:

VOCO Profluorid Varnish je recomandat a se folosi pentru:

1. tratamentul dintilor hipersensibili
2. sigilarea canaliculelor dentinare, ca de exemplu pentru preparamarea cavitatilor sau suprafeteelor radiculare sensibile

Metode de folosire:

Doza recomandată

- Tratamentul pacientilor cu dentitie temporala - folositi aprox. 0,25 ml de lac **VOCO Profluorid Varnish**
- Tratamentul pacientilor cu dentitie permanenta - folositi aprox. 0,40 ml de **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish se aplică într-un strat subțire pe suprafața dentară. Straturile groase se desprind mai ușor și nu oferă avantaje terapeutice mai bune. Conform cercetărilor, cantitatea de material necesară variază între 0,25 ml și 0,40 ml pentru o dentitie completă.

Aplicarea:

1. Îndepărtați complet tartrul din zonele ce urmează și fi trate.
2. Pentru a obține rezultate mai bune, îndepărtați din zona ce urmează și fi tratați saliva/umezeala excesivă.
3. Aplicați uniform lacul **VOCO Profluorid Varnish** formând o peliculă fină, acoperind suprafața ce urmează și fi tratată.
4. Permiteți zonei să se umezescă ori printr-o călărire a bucală sau natural printr-un flux salivar) astfel încât să se asigure întărirea adevarată a produsului **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Stătiți pacientul să nu consume produse de consistență tare și alcool, să evite periajul sau folosirea atei dentare pentru următoarele 4 ore după aplicare.

Informații și măsuri de precauție:

VOCO Profluorid Varnish conține colofoniu.

A nu se folosi **VOCO Profluorid Varnish** în cazuri de hipersensibilitate (alergie) cunoscuți la acest ingredient. Colofoniu poate inhiba polimerizarea și adheziunea materialelor compozite pe suprafața dentară.

Cartuşul trebuie folosit întotdeauna împreună cu canula de aplicare cu vârf bont

Lak s fluoridom za odpravljanje preobčutljivosti

Navodila za uporabo

Opis proizvoda:
VOCO Profluorid Varnish je lak s fluoridom za odpravljanje preobčutljivosti zob za zdravljene površine sklenene in dentina. Lak **VOCO Profluorid Varnish** se sprime na vlažne površine in dopušča preostalo vlago in slino.

VOCO Profluorid Varnish je etanolna suspenzija iz kolofonije z umetno aromo in sladila ksilitola. 1 ml laka **VOCO Profluorid Varnish** vsebuje 50 mg natrijevega fluorida, kar je enako 22,6 mg fluorida.

Indikacije:

Lak **VOCO Profluorid Varnish** je primeren za:

1. zdravljene preobčutljive zobe
2. zapiranje zobnih kanalov pri pripravi luknjic ali občutljivih površin zobnih korenin

Način nanosa:

Priporočivi odmerki

- Zdravljene pacientov z mlečnim zobovjem pribl. 0,25 ml laka **VOCO Profluorid Varnish**
- Zdravljene pacientov z menjalnim zobovjem ali stalnim zobovjem pribl. 0,40 ml laka **VOCO Profluorid Varnish**

Naneste tanek sloj laka **VOCO Profluorid Varnish** na trdno površino zoba. Debelejši sloj lahko hitro odpade in nima nobenih zdravilnih učinkov. Glede na izkušnje je treba za celotno zobovo nanesti med 0,25 ml in 0,40 ml laka.

Uporaba:

1. S površin, ki jih nameravate obdelati, temeljito odstranite zobni kamen.
2. Za boljši rezultat morate s površin, ki jih nameravate obdelati, odstraniti vse ostanke vlage/sline.
3. **VOCO Profluorid Varnish** enakomerno nanesite s čopičem za nanos ali penasto kroglico, tako da bo celotna površina pokrita s tanko plastjo.
4. Območje nanosa navlažite (z rahlim izpiranjem ali naravnim slijenjem), da zagotovite vezavo laka **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Pacientov morate opozoriti na to, da se mora 4 ure po zdravljenu izogibati trdi hrani, alkoholu, čiščenju zob in uporabi zobne nitke.

Navodila/varnostni ukrepi:

Lak **VOCO Profluorid Varnish** vsebuje kolofonijo.

Pri znani preobčutljivosti (alergijsah) na posamezne sestavine **VOCO Profluorid Varnish** materiala ne smete uporabiti.

Kolofonija lahko vpliva na polimerizacijo in oprijetljivost kompozitnih materialov.

Skupaj s cilindrsko ampulo uporablajte samo za predvidene type aplikacijske kanile (dlžina 32 mm, premer 0,9 mm). **VOCO Profluorid Varnish** lahko v cilindrski ampuli uporabite večkrat. Po aplikaciji odstranite kanilo in cilindrsko ampulo shranite brez kanile (ampula je tesno zaprta z gumijasto zaščito). Pred naslednjo aplikacijo namestite novo kanilo. Ustrezeno namenu uporabe ima **VOCO Profluorid Varnish** lepljivo konsistenco. Pri uporabi tube se lahko zaradi ostankov materiala na navoju prilepi pokrovček. Po potrebi odstranite nečistoče s pomočjo krpe, ki vsebuje etanol.

Laka **VOCO Profluorid Varnish** ne smete uporabljati pri pacientih z ulceriranimi dlesnimi, vneto kožo ustne sluznice.

Lak **VOCO Profluorid Varnish** ni primeren za sistemsko zdravljene. Redko se lahko pojavijo stranski učinki v obliku edematoznih oteklin, predvsem po uporabi na velikih površinah. Pri primerljivih preparativih se lahko v zelo redkih primerih pojavi težko dihanje pri otrocih z astro. Pri pacientih z občutljivim prebavnim sisttemom se lahko v primeru obsežnega zdravljenga pojavi slabost. V primeru preobčutljivosti: odstranite lak z mehko zobno krtko in zobno nitko in na koncu izperite s toplo vodo. Na dan zdravljenga ne izvajajte več postopkov z uporabo preparativ, ki vsebujejo fluorid. Po zdravljenu z lakovem **VOCO Profluorid Varnish** je treba opustiti jemanje fluoridnih tablet za nekaj dni. Laka ne smete zaužiti.

Shranjevanje:

Shranjujte na temperaturi med 4 °C in 23 °C. Laka **VOCO Profluorid Varnish** ne smete uporabljati po preteku datumu uporabe.

Naši preparati so razviti za uporabo v zobozdravstvu. Naša ustna in/ali pisna navodila in nasveti, ki zadevajo uporabo naših preparativ, temeljijo na našem najboljšem poznavanju in so neobvezujoča. Naša navodila in/ali nasveti vas ne osvobodijo lastne preizkušnje in presoje o primernosti za načrtovanje uporabe naših preparativ. Ker poteka uporaba naših preparativ brez našega nadzora, nosite odgovornost sami. Seveda pa zagotavljamo kakovost naših izdelkov v skladu z obstoječimi normami ter v skladu s standardi, ki so določeni v naših splošnih dostavnih in prodajnih pogojih.

Lak s obsahom fluoridov k desenzibilizácii zubov

Návod na použitie

Popis výrobku:
VOCO Profluorid Varnish je lak s obsahom fluoridov k desenzibilizácii zubov na ošetroenie povrchov skloviny a dentína. **VOCO Profluorid Varnish** prilieva na vlhkých povrchových plochách a toleruje zvyšky vlhkosti a slín.

VOCO Profluorid Varnish je etanolová suspenzia z kalafúny s umetnou arómou a osladzujúcim účinkom xylitolu. 1 ml prípravku **VOCO Profluorid Varnish** obsahuje 50 mg fluorida sodného, ktorý zodpovedá 22,6 mg fluorida.

Indikácie:

Lak **VOCO Profluorid Varnish** je primeren za:

1. ošetroenie precitlivých zubov
2. zapínanie zobních kanalov pri príprave luknjic alebo citlivých povrchov koreňov

Spôsob používania:

Odporúčaná dávka

- Pri ošetroení pacientov s mliečnym chrupom cca 0,25 ml prípravku **VOCO Profluorid Varnish**
- Pri ošetroení pacientov s miešaným chrupom alebo definitívnym chrupom cca 0,40 ml prípravku **VOCO Profluorid Varnish**

Naneste tenkú vrstvu prípravku **VOCO Profluorid Varnish** na Zubovinu. Hrubá vrstva sa ľahko oddeli a neposkytuje žiadne terapeutické výhody. Skúsenosť naznačuje, že množstvo potrebné na ošetroenie celého chrupu sa pohybuje medzi 0,25 ml a 0,40 ml.

Aplikácia:

1. Ošetrovanú plochu dôkladne očistite od zubného kameňa.
2. Lepší výsledok dosiahnete, ak z ošetrovanej plochy celkom odstráňte nadmernú vlhkosť/sliny.
3. **VOCO Profluorid Varnish** nanášajte rovnomerne tak, aby bol celý povrch pokryt tenkou vrstvou.
4. Oblast aplikácie navlhčte (buď miernym opláchnutím alebo prirodzeným tokom slín), aby bolo zaručené vytuhnute prípravku **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Pacientov musíte upozorniť na to, že po dobu 4 hodín po ošetroení sa musia vyhýbať pevnjej potrave, alkoholu, čisteniu zubov a použitiu dentálnej nite.

Navodila/varnostni ukrepi:

Lak **VOCO Profluorid Varnish** vsebuje kolofonijo.

Pri znani preobčutljivosti (alergijsah) na posamezne sestavine **VOCO Profluorid Varnish** materiala ne smete uporabiti.

Kolofonija lahko vpliva na polimerizacijo in oprijetljivost kompozitnih materialov.

Skupaj s cilindrsko ampulo uporablajte samo za predvidene type aplikacijske kanile (dlžina 32 mm, premer 0,9 mm). **VOCO Profluorid Varnish** lahko v cilindrski ampuli uporabite večkrat.

Po aplikaciji odstranite kanilo in cilindrsko ampulo shranite brez kanile (ampula je tesno zaprta z gumijasto zaščito). Pred naslednjo aplikacijo namestite novo kanilo. Ustrezeno namenu uporabe ima **VOCO Profluorid Varnish** lepljivo konsistenco. Pri uporabi tube se lahko zaradi ostankov materiala na navoju prilepi pokrovček. Po potrebi odstranite nečistoče s pomočjo krpe, ki vsebuje etanol.

Laka **VOCO Profluorid Varnish** ne smete uporabljati pri pacientih z ulceriranimi dlesnimi, vneto kožo ustne sluznice.

Lak **VOCO Profluorid Varnish** ni primeren za sistemsko zdravljene. Redko se lahko pojavijo stranski učinki v obliku edematoznih oteklin, predvsem po uporabi na velikih površinah. Pri primerljivih preparativih se lahko v zelo redkih primerih pojavi težko dihanje pri otrocih z astro. Pri pacientih z občutljivim prebavnim sisttemom se lahko v primeru obsežnega zdravljenga pojavi slabost. V primeru preobčutljivosti: odstranite lak z mehko zobno krtko in zobno nitko in na koncu izperite s toplo vodo. Na dan zdravljenga ne izvajajte več postopkov z uporabo preparativ, ki vsebujejo fluorid. Po zdravljenu z lakovem **VOCO Profluorid Varnish** je treba opustiti jemanje fluoridnih tablet za nekaj dni. Laka ne smete zaužiti.

Skladovanje:

Skladujte pri 4 °C - 23 °C. Po uplynutí dátumu expirácie prípravok **VOCO Profluorid Varnish** nepoužívajte.

Naši preparati so razviti za uporabo v zobozdravstvu. Naša ustna in/ali pisna navodila in nasveti, ki zadevajo uporabo naših preparativ, temeljijo na našem najboljšem poznavanju in so neobvezujoča. Naša navodila in/ali nasveti vas ne osvobodijo lastne preizkušnje in presoje o primernosti za načrtovanje uporabe naših preparativ. Ker poteka uporaba naših preparativ brez našega nadzora, nosite odgovornost sami. Seveda pa zagotavljamo kakovost naših izdelkov v skladu z obstoječimi normami ter v skladu s standardi, ki so določeni v naših splošnih dostavnih in prodajnih pogojih.

Dantų nujauninimo lakas, turintis fluoro

Naudojimo instrukcija

Produktu aprašymas:
VOCO Profluorid Varnish yra fluoro turintis dantų lakas, skirtas paviršiniams naudojimui ant emalio ir dentino.
VOCO Profluorid Varnish prilimpa ant drėgnų paviršių ir toleruoja drėgmę bei seiles.

VOCO Profluorid Varnish yra etanolio suspenzija su dirbtinis kvapais iš ksilitolito.

1 ml **VOCO Profluorid Varnish** satur 50 mg natrio fluorido atitinkančio 22,6 mg fluorida.

Indikacijos:

VOCO Profluorid Varnish skirtas naudoti:

1. jautrių dantų gydymui
2. dentino kanalėlių uždarymui preparuotose ertmėse ar jautriuose šaknų paviršiuose

Naudojimo būdas:

Rekomenduojama dozė:

- **Pacientams turintiems pieninių dantų skandį**
Naudokite apie 0,25 ml **VOCO Profluorid Varnish**
- **Pacientams turintiems mišrų arba nuolatinį skandį**
Naudokite apie 0,40 ml **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish tepamas plonu sluoksniu ant danties kietuju audiniu. Storas sluoksnis lengviau nusilupa nuo danties ir geresnio gydomojo efekto neduoda. Ipratus dirbtis visam dantu lankui sunaudojama nuo 0,25 ml iki 0,40 ml lakan.

Aplikacija:

1. Švarai nuvalykitė konkrementus ir apnašą nuo gydomu sričių.
2. Geresniam rezultatui pasiekti, pašalinkite drėgmės ir seilių perteklių nuo gydomu sričių.
3. Toligiai teptkite **VOCO Profluorid Varnish** lakan plonu sluoksniu, padengdamis visą reikiama paviršių.
4. Leiskite patepti sričiai sudrėkti (arba švelniai nuplaukite arba leiskite užtekti seilėms). Kad **VOCO Profluorid Varnish** tinka mai suukėtė.
5. Pacientov musite upozorniť na to, že po dobu 4 hodín po ošetroení sa musia vyhýbať pevnnej potrave, alkoholu, čisteniu zubov a použitiu dentálnej nite.

Informacia/atsargumo priemonēs:

VOCO Profluorid Varnish satur kolofoniju.

Ja ir zināms par paaugstinātu jutību (alerģiju) pret šim **VOCO Profluorid Varnish** sastāvdajām, no izmantošanas ir jāsakās. Kolofonij var ietekmēt kompozītmateriālu polimerizāciju un adhēziju.

Izmantot cilindriskās ampulas, vienmēr lietojiet tikai šim nolūkam paredzētās strapās aplikācijas kaniles (garums 32 mm, diametrs 0,9 mm). **VOCO Profluorid Varnish**, kas atrodas cilindriskā ampulā, ir izmantojams vairākkārt. Pēc apliešanas nonemiet kanili un uzglabājiet cilindrisko ampulu bez kaniles (ampulu cieši noslēdz gumijas starpsienā). Pirms nākamās apliešanas uzliediet jaunu kanili.

Prītītīkite naujā kaniliē sekiātām aplikācijām.

VOCO Profluorid Varnish lakan yra lipnios konsistencijos. Medžiagai perteklius arī vamzdelio sriegio briauņu galī suukētām galītēm. Nuvalykitė bet kokius lakan likučius audiniu, pamirkytu etanolīju.

Iespējamās traipus notiņet ar metanolā samitrinātu salveti.

VOCO Profluorid Varnish nedrīkst lietot pacientiem, kam ir cūlāri smaganu vai mutes gļotādas iekaisumi.

VOCO Profluorid Varnish nav paredzēts sistēmiskai jutīšanai.

Dažas gadījumos tika ziņots par tūskainu sapampumu, galvenokārt pēc lielu virsmu apstrādes. Lietojot līdzīgus preparātus, joti retos gadījumos tika saņemtas ziņas par elpas trūkumu, kas slimī ar astmu. Pacientiem ar jutīgu gremošanas sistēmu pēc plāšas apstrādes var būt nelabumā sajūta. Ja ir paaugstināta jutība ar mīkstu zobu suku un zobu diegu nonemiet laku, pēc tam noskalojiet ar situ ūdeni. Jutīšanās dienā nelietojiet citus preparātus, kas satur fluoridus. Pēc apstrādes ar **VOCO Profluorid Varnish** dažas dienas pārtrauciet fluorida tablešu lietošanu. Laku nedrīkst norīt.

Uzglabāšana:

Uzglabāt 4 °C - 23 °C temperatūrā. Pēc deriguma termina beigām **VOCO Profluorid Varnish** vairs nedrīkst lietot.

Mūsu preparāti ir paredzēti pielietošanai zobārstniecībā. Atiecībā uz mūsu preparātu pielietošanu, mūsu mutiskie un/vai rakstiske norādījumi, piem., mūsu ieteikumi, ir doti balstoties uz mūsu zināšanām un nav obligāti jāievēro. Mūsu norādījumi un/vai ieteikumi nenozīmē, ka Jums nebūtu jāpārbauda mūsu materiāli atbilstība Jūsu izvēlētajam pielietošanas veidam. Tā kā mēs nespējam kontroliot